



S.I.C.O.B.

Bari

SPRING MEETING

18 - 19 MAGGIO 2023

THE NICOLAUS HOTEL

CONDIVIDERE PER CRESCERE

Strategie di integrazione
in Chirurgia Bariatrica

Presidente del Congresso
ANTONIO BRAUN

Risultati a breve e lungo termine Redo Chirurgica

GIOVANNI FANTOLA

**SSD CHIRURGIA METABOLICA E
DELL'OBESITÀ**

ARNAS BROTZU CAGLIARI

PREMESSA

Quale è l'indicazione alla Redo?

IWL

WR

Secondo tempo

Reflusso

Quali criteri utilizzo per giudicare il successo?

EWL%

EBMIL%

BMI < 30 o 35 kg/m²

Risoluzione comorbidità

Breve termine 2 anni

Lungo termine 5 anni

Take Home Messages

Restrittivo su Restrittivo
ha scarsi risultati

A lungo termine tutte le
REDO tendono ad
equivalersi

(In assenza di RGE)

Le singole anastomosi
hanno risultati migliori
del RY (soprattutto per
DMT2 e SM)

È più importante BL o CL?
Contare tutto l'intestino

RISULTATI

Redo < Primitivi

Reflusso → R-RYGB

R-SG < R-RYGB < R-OAGB

EWL% > 50%

SADI



SAGI / SAS-J ?